

Primer registro de *Sturnella militaris* (Aves: Icteridae) en el Valle Central de Costa Rica

Luis Sandoval^{1,2} & Jorge Ellis²

1. Escuela de Biología, Universidad de Costa Rica. 2060. Costa Rica. biosandoval@hotmail.com

2. Asociación Ornitológica de Costa Rica, San José, Costa Rica.

(Recibido: 24 de octubre de 2005)

KEYWORDS. *Sturnella militaris*, Red-breasted Blackbird, Costa Rica, range extension

La Zacatera de Pecho Rojo (*Sturnella militaris*), se registró por primera vez en Costa Rica en 1970, cerca del río Sierpe (Kiff 1975), y desde entonces es una especie residente del Pacífico sur del país (Stiles & Smith 1980, Stiles & Skutch 1998). Por ser un ave que habita zonas abiertas, en especial aquellas con pastizales (Stiles 1985, Stiles & Skutch 1998), su ámbito de distribución en Sur América se ha ido ampliando conforme el bosque va perdiendo terreno (Ridgely & Tudor 1989, De Las Casas *et al.* 2004). Recientemente su ámbito de distribución en Costa Rica también se ha extendido, especialmente hacia la zona Atlántica. En 1999 se informó su presencia por primera vez en el Carmen de Siquirres (Araya 1999) y en 2004 en Tuis de Turrialba (Garrigues com. pers.). Sin embargo hasta la fecha no se conocen registros de esta especie en el Valle Central. Por lo que el objetivo de esta nota es dar a conocer la presencia de esta especie en esta zona de Costa Rica.

Observamos un macho adulto de *S. militaris* el 23 de abril de 2005, dentro de la Hacienda Las Cóncavas, en Paraíso de Cartago (9° 50' 14" N, 83° 53' 26" W), a 1340 m.s.n.m. El individuo estuvo posado sobre el suelo en el potrero, cerca del borde sur de la laguna. Este de tipo hábitat de pastizales cerca de cuerpos de agua, como aquellos inundados son los preferidos por esta especie a lo largo de toda su distribución (Stotz *et al.* 1996). Este informe amplía su distribución aproximadamente a 34 km al oeste de su último punto conocido y su ámbito de distribución altitudinal en 440 m.

la gira y participaron del avistamiento descrito. También agradecemos a César Sánchez por los comentarios hechos a un manuscrito previo.

LITERATURA CITADA

- Araya, V. 1999. *Sturnella militaris* en el Atlántico norte. *Zeledonia* 3: 6.
- De Las Casas, J., G. Stiles, I. Bolívar & J. Murillo. 2004. Range extension of two species of "Red - breasted" Meadowlarks (Icteridae: *Sturnella*) in Colombia. *Ornitología Colombiana* 2: 37-40.
- Kiff, L. 1975. Notes on the Southwestern Costa Rican birds. *Condor* 77: 101-103.
- Ridgely, R. & G. Tudor. 1989. The birds of South America. Vol. I: The oscine passerines. University of Texas Press. Austin, Texas, USA. 516p.
- Stiles, G. 1985. Conservation of forest birds of Costa Rica: Problems and perspectives. *In*: A.W. Diamond & T. S. Lovejoy (eds.) Conservation of tropical Forest Birds, Technical Publication N° 4, Cambridge International Council for Bird Preservation. pp. 121-138.
- Stiles, G. & S. Smith. 1980. Notes on bird distribution in Costa Rica. *Brenesia* 17: 137-156.
- Stiles, G. & A. Skutch. 1998. Guía de Aves de Costa Rica. 2ed. INBio. Heredia, Costa Rica. 580 p.
- Stotz, D., J. Fitzpatrick, T. Parker & D. Moskovitz. 1996. Neotropical birds: ecology and conservation. Universidad de Chicago. Chicago. 478 p.

AGRADECIMIENTOS

Le agradecemos a Pablo Elizondo, Nancy Orias y Elidier Vargas quienes nos acompañaron durante